



## DOCUMENTO LOCAL DEL PRODUCTO

Título del Documento de Producto: Clorhidrato de Idarubicina  
Fecha del CDS reemplazado: 07 de Octubre 2008  
Fecha efectiva del CDS: 06 de Marzo 2014  
CDS versión: 3.0

### 1. NOMBRES DEL MEDICAMENTO

ZAVEDOS®.

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

El Clorhidrato de Idarubicina está disponible como:

Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable de 10 mg de Clorhidrato de Idarubicina.

### 3. FORMAS FARMACÉUTICAS

Polvo estéril para solución inyectable.

### 4. DETALLES CLÍNICOS

#### 4.1 Indicaciones Terapéuticas

Coadyuvante en el tratamiento de la Leucemia mielógena aguda (AML, por sus siglas en inglés) en adultos y tratamiento de segunda línea para Leucemia linfocítica aguda (ALL, por sus siglas en inglés) en adultos y niños.

#### 4.2 Posología y Método de Administración

##### Administración intravenosa

La Idarubicina, ya sea a manera de la solución reconstituida o de una solución lista para su uso, debe administrarse únicamente por vía intravenosa (véase Sección 6.2). Debe efectuarse una lenta administración en el transcurso de 5 - 10 minutos a través del tubo de venoclisis de una infusión intravenosa de libre flujo de cloruro de sodio al 0.9% o de dextrosa al 5%. No se recomienda la inyección de bolo directo debido al riesgo de extravasación, el cual puede ocurrir incluso en presencia de un adecuado retorno sanguíneo luego de la aspiración ejercida por la aguja (véase Sección 4.4).

- **ANLL/AML.** En leucemia no linfocítica aguda (ANLL/AML) de adultos, el esquema de dosificación intravenosa recomendado es 12 mg/m<sup>2</sup> diarios durante 3 días en combinación con citarabina. La idarubicina puede también administrarse como agente único y en terapia de combinación, a una dosis de 8 mg/m<sup>2</sup> diarios durante 5 días.
- **ALL.** En leucemia linfocítica aguda (ALL) de adultos, la dosis intravenosa recomendada al usarla como único agente es 12 mg/m<sup>2</sup> diarios durante 3 días. En niños con ALL, la dosis intravenosa recomendada como monoterapia es 10 mg/m<sup>2</sup> diarios durante 3 días.

Todos estos esquemas de dosificación deberán, sin embargo, tomar en cuenta el estatus hematológico del paciente y las dosis de otras drogas citotóxicas que se usen en una terapia de combinación.

### **Modificación de la dosis.**

*Pacientes con Disfunción Renal o Hepática.* Si bien no pueden hacerse recomendaciones específicas para la dosificación con base en la limitada información disponible en pacientes con deterioro renal y/o hepático, deben considerarse reducciones en las dosis en pacientes con niveles séricos de bilirrubina y/o creatinina mayores a 2.0 mg % (véase Sección 4.4).

Idarubicina no debe ser administrada en pacientes con deterioro severo de la función hepática y/o renal (véase Sección 4.3).

### **4.3 Contraindicaciones**

Embarazo, Lactancia, pacientes con daño renal o hepático grave, con infecciones no controladas, supresión de la médula ósea, enfermedad cardíaca pre-existente.

### **4.4 Advertencias Especiales y Precauciones en el uso**

Antes y después del tratamiento se deben realizar electrocardiogramas y ecocardiogramas.

**Generales.** La idarubicina debe ser administrada únicamente bajo la supervisión de médicos con experiencia en el uso de quimioterapia con citotóxicos.

Los pacientes deberán recuperarse de toxicidades agudas de tratamientos previos con citotóxicos (tales como estomatitis, neutropenia, trombocitopenia, e infecciones generalizadas) antes de comenzar el tratamiento con Idarubicina.

**Función Cardíaca.** La cardiotoxicidad constituye un riesgo del tratamiento con antraciclinas que puede manifestarse por la aparición de eventos tempranos (v.g., agudos) o tardíos (v.g., retardados).

*Eventos Tempranos (v.g., Agudos).* La cardiotoxicidad temprana de la Idarubicina consiste principalmente en la aparición de taquicardia sinusal y/o anomalías en el ECG tales como cambios no específicos en la onda ST-T. Se han reportado también taquiarritmias, incluyendo contracciones ventriculares prematuras, taquicardia ventricular, bradicardia, así como también bloqueo atrioventricular y bloqueo de rama. Estos efectos usualmente no predicen el desarrollo subsiguiente de la cardiotoxicidad retardada, son raramente de importancia clínica, y generalmente no se tienen en cuenta para la discontinuación del tratamiento con Idarubicina.

*Eventos Tardíos (v.g., Retardados).* La cardiotoxicidad retardada usualmente se desarrolla tarde en el curso de la terapia con Idarubicina o dentro de los 2 - 3 meses siguientes a la finalización del tratamiento, pero se han reportado también eventos más tardíos, desde varios meses a años después de terminado el tratamiento. La cardiomiopatía de desarrollo tardío se manifiesta por una disminución de la fracción de eyección ventricular izquierda (LVEF, sigla en inglés) y/o signos y síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) tales como disnea, edema pulmonar, cardiomegalia y hepatomegalia, edema dependiente, oliguria, ascitis, derrame pleural, y ritmo galopante. Existen también reportes de efectos subagudos tales como pericarditis/miocarditis. La ICC con compromiso de la vida del paciente es la forma más severa de cardiomiopatía inducida por las antraciclinas y representa el límite de la dosis acumulativa tóxica de la droga.

No se han definido los límites de las dosis acumuladas para la Idarubicina IV u oral. Sin embargo, se ha reportado cardiomiopatía asociada con la droga en el 5% de los pacientes

que recibieron una dosis IV acumulativa de 150 a 290 mg/m<sup>2</sup>. La información disponible de pacientes tratados con dosis totales acumuladas de Idarubicina oral hasta de 400 mg/m<sup>2</sup>, sugieren una baja probabilidad de desarrollo de cardiotoxicidad.

La función cardíaca deberá evaluarse antes de someter los pacientes a tratamiento con Idarubicina y deberá monitorearse a través de toda la terapia a fin de minimizar el riesgo de incurrir en un deterioro cardíaco severo. El riesgo puede reducirse mediante el monitoreo regular de la LVEF durante el curso del tratamiento, con la oportuna discontinuación de la Idarubicina ante el primer signo de alteración de la función. Entre los métodos cuantitativos apropiados para la valoración repetida de la función cardíaca (evaluación de la LVEF) están la angiografía de radionúclidos multicompuerta (MUGA) o la ecocardiografía (ECHO). Se recomienda efectuar una valoración cardíaca de línea de base con un ECG y ya sea un escaneo MUGA o una ECHO, especialmente en pacientes con factores de riesgo de desarrollar cardiotoxicidad incrementada. Deberán ejecutarse repetidas determinaciones de MUGA o de Ecocardiografía de la LVEF, particularmente usando dosis superiores, acumulativas, de la antraciclina. La técnica usada para la valoración deberá ser consistente a través de todo el seguimiento

Entre los factores de riesgo de toxicidad cardíaca se incluyen la enfermedad cardiovascular activa o latente, radioterapia mediastinal/pericárdica previa o concomitante, terapia previa con otras antraciclinas o antracenedionas, y el uso concomitante de drogas con capacidad de suprimir la contractilidad cardíaca o drogas cardiotoxícas, (por ejemplo, trastuzumab). Las antraciclinas incluyendo idarubicina no deben ser administradas en combinación con otros agentes cardiotoxícos a menos que la función cardíaca de los pacientes sea cercanamente monitoreada (véase Sección 4.5). Los pacientes que estén recibiendo antraciclinas después parar el tratamiento con otros agentes cardiotoxícos, especialmente aquellos con vidas medias prolongadas como el trastuzumab, pueden también tener un riesgo incrementado de desarrollar cardiotoxicidad. La vida media de trastuzumab informada es aproximadamente 28-38 días y puede persistir en la circulación por hasta 27 semanas. Por lo tanto, los médicos deben evitar terapia basada en antraciclina por hasta 27 semanas después de suspender el trastuzumab cuando sea posible. Si se usan antraciclinas antes de este tiempo, se recomienda un monitoreo cuidadoso de la función cardíaca.

La función cardíaca debe ser particularmente estricta en pacientes que reciben altas dosis acumulativas y en aquellos con factores de riesgo. Sin embargo, puede ocurrir cardiotoxicidad con idarubicina en dosis acumulativas bajas con o sin factores de riesgo cardíaco presente.

En los infantes y niños parece haber una mayor susceptibilidad a la toxicidad cardíaca inducida por antraciclina, por lo cual se debe realizar una monitorización periódica y a largo plazo de la función cardíaca.

Es probable que el efecto tóxico de la Idarubicina y otras antraciclinas y antracenedionas sea aditivo.

**Toxicidad Hematológica.** La Idarubicina es un potente supresor de la médula ósea. Puede ocurrir mielosupresión severa en todos los pacientes que reciban dosis terapéuticas de este agente. Deberán evaluarse los perfiles hematológicos antes y durante cada ciclo de terapia con Idarubicina, incluyendo recuentos diferenciales de células sanguíneas blancas (leucocitos). Una leucopenia y/o granulocitopenia (neutropenia) reversibles y dosis dependientes, constituyen las manifestaciones predominantes de la toxicidad hematológica con Idarubicina y es la toxicidad aguda más frecuente y dosis limitante de esta droga. La leucopenia y neutropenia son usualmente severas; puede también ocurrir trombocitopenia y anemia. Los recuentos de neutrófilos y plaquetas generalmente alcanzan su nadir entre los días 10 y 14 después de la administración de la droga; sin embargo, el recuento celular regresa a los valores normales hacia la tercera semana. Entre las consecuencias clínicas de

la mielosupresión severa se incluyen la fiebre, infecciones, sepsis/septicemia, shock séptico, hemorragia, hipoxia de los tejidos, o la muerte

**Leucemia Secundaria.** Se ha reportado leucemia secundaria, con o sin una fase preleucémica, en pacientes tratados con antraciclinas, incluyendo la Idarubicina. La leucemia secundaria se observa con mayor frecuencia cuando tales drogas se suministran en combinación con agentes antineoplásicos que produzcan daños en el ADN, cuando previamente los pacientes hayan recibido tratamientos agresivos con drogas citotóxicas, o cuando las dosis de las antraciclinas hayan sido objeto de fuertes incrementos. Estas leucemias pueden exhibir un período de latencia de 1 a 3 años

**Eventos Gastrointestinales.** La Idarubicina es emetogénica. Ocurre mucositis (principalmente estomatitis, con menor frecuencia esofagitis), generalmente de manera temprana después de la administración de la droga y, si es severa, puede progresar en el transcurso de unos pocos días a ulceraciones de la mucosa. La mayoría de los pacientes se recuperan de este evento adverso hacia la tercera semana de la terapia.

Se han observado ocasionalmente episodios de eventos gastrointestinales graves (tales como perforación o sangrado) en pacientes que reciben Idarubicina oral que hayan presentado leucemia aguda o un historial de otras patologías o hayan recibido medicaciones de las cuales se conoce conducen a complicaciones gastrointestinales. En pacientes con enfermedad gastrointestinal activa con riesgo incrementado de sangrado y/o perforación, el médico debe sopesar el beneficio de la terapia con Idarubicina oral contra los riesgos de la misma.

**Función Renal y/o Hepática.** Debido a que el deterioro de la función renal y/o hepática puede afectar la disponibilidad de la Idarubicina, deberán evaluarse las funciones renal y hepática usando pruebas de laboratorio clínico convencionales (empleando los niveles de bilirrubina sérica y creatinina sérica como indicadores) antes y durante el tratamiento. En cierto número de estudios clínicos de Fase III, el tratamiento se contraindicó si los niveles séricos de bilirrubina y/o creatinina excedían de 2.0 mg %. Al igual que con otras antraciclinas, generalmente se acostumbra la reducción de la dosis en un 50% en caso de que los niveles de bilirrubina estén en el rango entre 1.2 - 2.0 mg % (véase Sección 4.2).

**Efectos en el Sitio de Inyección.** Puede desarrollarse fleboesclerosis a causa de la inyección en un vaso sanguíneo pequeño o de repetidas inyecciones en la misma vena. El riesgo de flebitis/tromboflebitis en el sitio de inyección puede reducirse si se observan los procedimientos de administración recomendados (véase Sección 4.2).

**Extravasación.** La extravasación de la Idarubicina durante la inyección intravenosa puede producir dolor localizado, lesiones severas en los tejidos (formación de ampollas, celulitis severa), y necrosis. Deberá detenerse inmediatamente la infusión de la droga en caso de que se observen signos o síntomas de extravasación durante la administración intravenosa de Idarubicina.

**Síndrome de Lisis Tumoral.** La Idarubicina puede inducir hiperuricemia como consecuencia del intenso catabolismo de las purinas que acompaña la lisis rápida de las células neoplásicas inducida por la droga ('síndrome de lisis tumoral'). Deberán evaluarse los niveles sanguíneos de ácido úrico, potasio, fosfato de calcio y creatinina después del tratamiento inicial. Medidas como la hidratación, la alcalinización de la orina, y la profilaxis con alopurinol, tendientes a prevenir la hiperuricemia, pueden reducir las complicaciones potenciales del síndrome de lisis tumoral

**Efectos Inmunosupresores/Aumento de la susceptibilidad a infecciones.** La administración de vacunas vivas atenuadas en pacientes inmunocomprometidos, secundario al tratamiento con agentes quimioterapéuticos, incluyendo la Idarubicina, puede ocasionar infecciones severas o fatales. La vacunación con una vacuna viva atenuada debe evitarse

en los pacientes con que estén recibiendo Idarubicina. Las vacunas inactivadas o muertas pueden ser administradas, sin embargo la respuesta a estas puede estar disminuida.

**Otros.** Tal como sucede con otros agentes citotóxicos, se han reportado de manera casual con el uso de Idarubicina tromboflebitis y fenómenos tromboembólicos, incluyendo embolismo pulmonar.

#### **4.5 Interacción con Otros Productos Medicinales y Otras Formas de Interacción**

La Idarubicina es un potente mielosupresor y los regímenes de quimioterapia de combinación que contengan otros agentes con acción similar pueden conducir a toxicidad aditiva, especialmente con respecto a los efectos hematológicos, efectos sobre la médula ósea y los efectos gastrointestinales (véase Sección 4.4). El uso de Idarubicina en quimioterapia de combinación con otras drogas potencialmente cardiotoxicas, así como también el uso concomitante de otros compuestos cardioactivos (v.g., bloqueadores de los canales del calcio), exige el monitoreo de la función cardíaca durante todo el tratamiento.

Los cambios en la función hepática inducidos por terapias concomitantes pueden afectar el metabolismo, la farmacocinética, la eficacia terapéutica y/o la toxicidad de la Idarubicina (véase Sección 4.4).

Puede ocurrir un efecto mielosupresor aditivo cuando ha administrado radioterapia concomitantemente o dentro de las 2-3 semanas previas al tratamiento con Idarubicina.

#### **4.6 Fertilidad, Embarazo y Lactancia**

(Véase también Sección 5.3)

**Deterioro de la Fertilidad.** La Idarubicina puede inducir daños cromosómicos en los espermatozoides humanos. Por esta razón, los hombres sometidos a tratamiento con Idarubicina deberán tomar medidas anticonceptivas.

**Embarazo.** El potencial embriotóxico de la Idarubicina ha quedado demostrado tanto en estudios in vitro como in vivo. Sin embargo, no se cuentan con estudios en mujeres en embarazo. Las mujeres con posibilidad de quedar en embarazo deberán ser advertidas para evitar la concepción durante el tratamiento. La Idarubicina deberá usarse durante el embarazo únicamente si los beneficios potenciales justifican el posible riesgo para el feto. La paciente deberá ser informada de los peligros potenciales para el feto.

**Lactancia.** No se conoce si la Idarubicina o sus metabolitos son excretados por la leche materna. Deberán darse instrucciones a las madres para que no amamenten a sus hijos mientras se encuentren en quimioterapia con esta droga.

#### **4.7 Efectos sobre la Capacidad para Manejar y Usar Máquinas.**

El efecto de Idarubicina sobre la capacidad para manejar y usar maquinaria no ha sido evaluado.

#### **4.8 Efectos Indeseables**

Los siguientes eventos adversos (no listados en orden de frecuencia) han sido reportados en asociación con la terapia con idarubicina (véase también la Sección 4.4)

**Infecciones e infestaciones:** Infección, sepsis/septicemia.

**Neoplasias benignas, malignas y no especificadas:** Leucemias secundarias (leucemia mieloide aguda y síndrome mielodisplásico)

**Alteraciones hematológicas y linfáticas:** Anemia, leucopenia, neutropenia, trombocitopenia.

**Alteración del sistema inmune:** Anafilaxia

**Alteraciones del metabolismo y la nutrición:** Anorexia, deshidratación, hiperuricemia.

**Alteraciones cardíacas:** Bloqueo atrioventricular, bloqueo de rama, falla cardíaca congestiva, miocarditis, pericarditis, taquicardia sinusal, taquiarritmias.

**Alteraciones vasculares:** Hemorragia, ruborización, flebitis, shock, tromboflebitis, tromboembolismo.

**Alteraciones gastrointestinales:** Dolor abdominal o sensación de quemadura, colitis (entre los cuales enterocolitis severa/ enterocolitis neutropénica con perforación), diarrea, erosión/ulceración, esofagitis, hemorragia gastrointestinal, mucositis/ estomatitis, náuseas, emesis.

**Alteraciones de la piel y tejido subcutáneo:** Eritema acral, alopecia, hipersensibilidad de la piel irradiada ('reacción evocadora de radiación'), toxicidad local, erupciones cutáneas/prurito, cambios en la piel, hiperpigmentación de piel y uñas, urticaria.

**Alteraciones renales y urinarias:** Hematuria durante 1o 2 días posteriores a la administración.

**Trastornos generales y condiciones del sitio de administración:** Fiebre.

**Investigaciones:** Disminución asintomática en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, anomalías en el ECG, niveles elevados de las enzimas hepáticas y la bilirrubina.

#### **4.9 Sobredosis**

Las dosis muy altas de Idarubicina pueden causar toxicidad miocárdica aguda dentro de las 24 horas siguientes y mielosupresión severa al cabo de 1 - 2 semanas. Se ha observado insuficiencia cardíaca retardada con el uso de antraciclinas varios meses después de una sobredosificación.

Los pacientes tratados con Idarubicina oral deberán observarse en busca de posibles episodios de hemorragia gastrointestinal y daños severos en las mucosas.

### **5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS**

#### **5.1 Propiedades Farmacodinámicas**

La Idarubicina es un análogo de la Daunorubicina que se intercala en el DNA, el cual tiene un efecto inhibitorio de la síntesis del ácido nucleico e interactúa con la enzima Topoisomerasa II. La ausencia de un grupo metoxi en la posición 4 de la estructura de la antraciclina le da su característica de alta liposolubilidad, lo cual resulta en un incremento en el porcentaje de captación celular del medicamento, en comparación con la Doxorubicina y la Daunorubicina.

La Idarubicina ha demostrado tener mayor potencia en relación con la Daunorubicina y ser un agente efectivo, tanto vía oral como intravenosa, en el tratamiento de la leucemia murina y linfomas. Estudios in Vitro en células de humanos y murinas resistentes a la antraciclina, han mostrado un menor grado de resistencia cruzada para la Idarubicina, comparado con la

Doxorubicina y la Daunorubicina. Estudios de cardiotoxicidad en animales han indicado que idarubicina tiene un mejor índice terapéutico que Daunorubicina y Doxorubicina, El Idarubicinol, el principal metabolito de la idarubicina, ha mostrado en modelos experimentales actividad antitumoral tanto in Vitro como in vivo. En las ratas, idarubicinol administrado a la misma dosis de su droga madre, es claramente menos cardiotoxic que idarubicina.

## 5.2 Propiedades Farmacocinéticas

### Intravenoso

En los pacientes con una función renal y hepática normal, la Idarubicina administrada IV es eliminada desde la circulación sistémica con un vida media terminal en plasma de entre 11 y 25 horas y es extensamente metabolizada a un metabolito activo, el Idarubicinol, el cual es más lentamente eliminado con un vida media en plasma de 41 a 69 horas. El medicamento es eliminado por excreción biliar y renal, principalmente en la forma de Idarubicinol.

Se ha visto en estudios celulares (células sanguíneas nucleadas y de la médula ósea) que la concentración de la droga en pacientes leucémicos ha mostrado que el pico en las concentraciones celulares del Idarubicinol se alcanza en pocos minutos luego de la inyección. Las concentraciones de Idarubicina e Idarubicinol en las células sanguíneas nucleadas y de la médula ósea son 100 veces más altas que en el plasma. Los porcentajes de desaparición de la Idarubicina en el plasma y las células fueron casi comparables, con un vida media final de aproximadamente 15 horas. La vida media de idarubicinol en células fue de cerca de 72 horas.

### Poblaciones especiales

*Alteración hepática y renal.* La farmacocinética de la Idarubicina en los pacientes con alteración hepática y/o renal no han sido completamente evaluada. Se espera que en los pacientes con disfunción hepática de moderada a severa, el metabolismo de la Idarubicina pueda ser alterado y esto conduzca a niveles sistémicos más altos. La disposición de la Idarubicina puede también ser afectada por daño renal. Por lo tanto en pacientes con alteración renal y/o hepática se debe considerar disminuir la dosis (véase Sección 4.2 y 4.4) y la Idarubicina debe ser contraindicada en pacientes con falla renal y/o hepática severa (véase Sección 4.3).

**Pediátrico.** Mediciones farmacocinéticas en 7 pacientes pediátricos recibiendo Idarubicina intravenosa en un curso de tratamiento de 3 días con dosis de 15 a 40 mg/m<sup>2</sup>, mostraron una vida media de Idarubicina de 8.5 horas (rango: 3.6 – 26.4 horas). El metabolito activo, Idarubicinol, acumulado durante el tratamiento de 3 días, exhibe una vida media promedio de 43.7 horas (rango: 27.8-131 horas).

En un estudio separado, las mediciones farmacocinéticas en 15 pacientes pediátricos que recibieron Idarubicina oral en un curso de tratamiento de 3 días con dosis entre 30 y 50 mg/m<sup>2</sup>, reportó una vida media terminal promedio de Idarubicina de 9.2 horas (rango: 6.4-25.5 horas). Se observó una acumulación considerable de Idarubicinol durante el periodo de tratamiento de 3 días.

## 5.3 Datos de Seguridad Preclínica

En muchos de las pruebas in vitro como in vivo, la Idarubicina ha sido genotóxica. La Idarubicina Intravenosa fue carcinogénica, tóxica para los órganos reproductores y embriotóxica y teratogénica en ratas. No evidenciaron efectos notables en las ratas madres o sus crías cuando se les administró dosis superiores a 0.2 mg/kg/día de Idarubicina intravenosa, durante el periodo peri o post natal. No se conoce si hay eliminación del compuesto por la leche materna. La Idarubicina intravenosa, así como otras antraciclinas y drogas citotóxicas, fueron carcinogénicas en ratas. Un estudio local de seguridad realizado en perros mostró que la extravasación del medicamento causó necrosis tisular.

La DL50 de la Idarubicina intravenosa fue de 4.4 mg/Kg. para ratones, 2.9 mg/Kg. para ratas y aproximadamente de 1.0 mg/kg para perros. Luego de la administración de una única dosis, el principal objetivo fue el sistema linfopoyético, y especialmente en perros el tracto gastrointestinal.

Los efectos tóxicos posteriores a varias administraciones intravenosas de Idarubicina fueron investigadas en ratas y perros. Los principales objetivos de la Idarubicina intravenosa en la mayoría de las especies animales fueron el sistema hematopoyético, en tracto gastrointestinal, el riñón, el hígado, y los órganos reproductivos masculinos y femeninos.

Los estudios sobre cardiotoxicidad indican que la Idarubicina intravenosa fue de ligeramente a moderadamente cardiotoxica solamente a dosis letales, a diferencia de la Doxorubicina y la Daunorubicina las cuales generan un claro deterioro miocárdico a dosis no letales.

## **6. DETALLES FARMACÉUTICOS**

### **6.1 Incompatibilidades**

La Idarubicina no deberá mezclarse con otras drogas en un mismo recipiente. El contacto con cualquier solución de pH alcalino deberá evitarse ya que esto puede dar como resultado la degradación de la droga. La Idarubicina no deberá mezclarse con heparina debido a incompatibilidad química que puede conducir a la precipitación.

### **6.2 Precauciones Especiales para la Disposición y Otras Manipulaciones**

Preparación de la solución. El vial de Idarubicina de 10 mg debe ser disuelto en 10 mL de agua únicamente para inyecciones. La solución obtenida es hipotónica y se recomienda emplear el proceso de administración de esta sustancia como está indicado en seguida.

Medidas de Protección. Las siguientes recomendaciones de protección se suministran debido a la naturaleza tóxica de esta sustancia:

- El personal de atención médica deberá estar entrenado en las buenas técnicas de reconstitución y manipulación de viales.
- Deberán excluirse de trabajar con la droga las mujeres de la planta de personal que cursen un embarazo.
- El personal que manipule la Idarubicina deberá usar ropa protectora: gafas de seguridad, gorros, guantes y máscaras desechables.
- Deberá destinarse un área especialmente diseñada para la reconstitución (preferiblemente bajo una cabina con sistema de flujo laminar). La superficie de trabajo deberá estar protegida con papel absorbente desechable con respaldo de plástico.
- Todos los ítems usados para la reconstitución, administración o limpieza, incluyendo los guantes, deberán colocarse en bolsas para disposición de desechos de alto riesgo a fin de efectuar su posterior incineración a altas temperaturas.
- Los derrames o fugas deberán ser tratados con una solución de hipoclorito de sodio diluido (1% de cloro disponible), preferiblemente mediante empapado, y luego con agua.
- Todos los materiales de limpieza deberán desecharse en la forma antes indicada.
- En caso de contacto accidental con la piel o los ojos, deberá efectuarse un tratamiento inmediato mediante el lavado con abundantes cantidades de agua, o con jabón y agua, o con una solución de bicarbonato de sodio. Luego, busque asistencia médica.
- Lávese siempre las manos después de retirar los guantes de protección.
- Deseche toda porción de solución no usada.